



aus: Naumann

## *Ciconia nigra*

### Schwarzstorch / Black Stork

[ Aves , Ciconiiformes , Ciconiidae ]

#### Merkmale

Wie Weißstorch, jedoch überwiegend metallisch schwarz glänzend und nur bauchseitig weiß. Langer Schnabel und lange Watbeine blutrot.



#### Biologie

- Verbreitung** Südwest- und Südosteuropa. Restvorkommen in Polen, Lausitz, Niedersachsen und Bayern (z.B. Oberpfalz und bei Füßen). In vielen Gebieten vom Aussterben bedroht. Gründe: Umwandlung von Natur- in Wirtschaftswälder, Entwässerung versumpfter Wälder, Forstarbeiten und Besucherverkehr während der Brutzeit. Die Restbestände in Niedersachsen und Bayern haben sich in den vergangenen Jahren jedoch etwas erholt.
- Biotop** Kulturflüchter, zieht sich in urwüchsige feuchte Laub- und Mischwälder zurück.
- Nahrung** Er ernährt sich hauptsächlich von Wasserinsekten, kleinen Fischen, Fröschen und Molchen. Bedingt durch seine Nahrung ist er stärker als der Weißstorch an Wasser und Feuchtigkeit gebunden.
- Brut** Nester aus Ästen mit feinem Polstermaterial, in Mitteleuropa meist in hohen Bäumen im Wald. 2–6, meist 3–5 Eier. Legebeginn ab April/Mai, 1 Jahresbrut. Brutdauer 32–40 Tage. Beide Geschlechter brüten und füttern. Nestlingsdauer 63–71 Tage.
- Winter** Wie der Weißstorch ist er ein Langstreckenzieher, der in Ostafrika und im tropischen Westafrika überwintert.
- Sonstiges** Bei uns ist der Schwarzstorch eher ein seltener Brutvogel.