



aus : Naumann

Upupa epos

Wiedehopf

[Aves , Coraciiformes , Upupidae]

-
- Merkmale** Diese kurzbeinigen Tiere sind größer als ein Star und besitzen einen langen, schlanken, nach unten gebogenen Schnabel.
- Verbreitung** Eurasien. Am Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte ein Zurückweichen aus den nördlichen und westlichen Gebieten, ab Mitte 1950 scheint aber eine neue Wiederbesiedlungswelle eingesetzt zu haben. Ursachen könnten hier Klimaschwankungen gewesen sein. Inzwischen ist er aber bei uns wieder stark im Rückgang begriffen, diesmal aber auf Grund menschlicher Einflüsse.
- Biotop** Offene Landschaften wärmtrockener Klimate, lockere, lichte Wälder, Gärten und Ackerlandschaften, Weidegebiete.
- Nahrung** Bodenjagd: Hauptnahrung sind größere Wirbellose, Insekten und deren Larven, Spinnen, Asseln und Regenwürmer, allerdings auch kleinere Wirbeltiere (z.B. Eidechsen). Die Tiere picken aber auch gerne Maden aus Kuhfladen heraus.
- Brut** Baumhöhlenbrüter, Ganz- oder Halbhöhlen, wie Astlöcher, Spechthöhlen, Steinhaufen, auch in großen Nistkästen. Nester mit wenig oder keinem Nistmaterial. 5–8 Eier je Gelege. In Mitteleuropa meist nur eine Jahresbrut. Im Süden brütet er häufig in Olivenbäumen oder Steineichen. Sie nehmen aber auch gerne Nisthöhlen an.
- Winter** Paläarktische Populationen sind Zugvögel, die in den Tropen Afrikas bzw. Indiens überwintern. Nur südliche und östliche Populationen sind Teilzieher.
- Alter** Ältester Ringvogel 11 Jahre.
-