


Martes foina

Steinmarder, 'Hausmarder'

[Mammalia , Carnivora , Mustelidae , Martes]

Merkmale

Sehr ähnlich dem Baummarder, Kehlfärbung jedoch weiß, erstreckt sich weit nach hinten über die Vorderläufe.



Schädel: Im Unterschied zum Baummarder ist der letzte obere Backenzahn nach außen eingeschnitten!

Verbreitung

In Mittel- und Südeuropa, gemäßigtes Eurasien bis zum Himalaya und China.

Biologie

Verbreitung In Mittel- und Südeuropa, gemäßigtes Eurasien bis zum Himalaya und China.

Lebensraum Der Steinmarder bevorzugt wenig bewachsenes möglichst felsiges Gelände, lichte Wälder, Parks und Siedlungen. Im Gegensatz zum Baummarder hat sich der Steinmarder verstärkt an menschliche Siedlungen angepaßt und dringt bis in Großstädte vor. Als Automarder, der mit Vorliebe Schläuche durchbeißt, sorgt er in letzter Zeit zunehmend für Verdross, zumindest bei Autobesitzern.

Nahrung



Kleinsäuger und Vögel bis zu Kaninchengröße. Wald- u. Gelbhalsmäuse, Vögel, Käfer, Wespen, Blaubeeren.

Bestimmung Unterschiede Baummarder – Steinmarder

