



© Ralf Schmode

Fam. Mustelidae

Marderartige – Mustelids

[Mammalia , Carnivora]

Die Carnivoren-Familie der Marder umfaßt 24 Gattungen mit 65 Arten. Sie enthält die 5 Unterfamilien der Raubmarder, Dachse, Honigdachse, Stinktiere und Otter.

Merkmale

Körper Sohlen behaart (Behaartsohlige). Niedriggestellter, langgestreckter Leib. Im Ruhegang Sohlengänger, im schnellen Lauf Zehengänger.
Hüpfendes Springen, Normales Tempo: Hinterläufe greifen in die Tritte der Vorderläufe. Fährte: Charakteristische Paarspur. Bei starker Flucht: Hinterläufe schnellen über die Vorderläufe über.

Stinkdrüsen besonders beim in Nordamerika beheimateten Skunk gut ausgebildet.

Sinne Hochentwickelte Sinnesorgane.

Fortpfl. Hohe Vermehrungsrate mit ausgeprägten Brutpfleginstinkten. 2–10 Junge werden in Kinderstuben zur Welt gebracht. Diese sind zunächst noch blind und unbeholfen.

Bei vielen Marder-Arten tritt eine Eiruhe auf, d.h. die im Sommer befruchteten Eier ruhen 6 bis 7 Monate im Mutterleib und entwickeln sich erst im folgenden Frühjahr weiter.

Systematik

Heimische Vertreter aus 3 Unterfamilien: Fischotter, Dachs und Marder i.e.S.

Dachse – Melinae



Dachs – *Meles meles*

Otter – Lutrine



Fischotter – *Lutra lutra*

Mustelinae – Echte Melinae



Gatt. *Martes*

Baum- oder Edelmarder –
Martes martes

Stein- oder Hausmarder –
Martes foina

Gatt. *Mustela*

Iltis – *Mustela putorius*

Hermelin, Großwiesel – *Mustela*
erminea

Mauswiesel, Kleinwiesel –
Mustela nivalis

Weitere Beispiele

Vielfraß – *Gulo gulo*