

# *Apodemus sylvaticus*

## Waldmaus, Long-tailed Field Mouse

[ Mammalia , Rodentia , Muridae ]

---

### Merkmale

Kleiner, Augen und Ohren nicht so groß wie bei der Gelbhalsmaus. Insgesamt etwas dunkler als die Gelbhalsmaus; Oberseite mehr graubraun, Unterseite weißgrau, an den Flanken weniger deutlich abgesetzt. Ockerfarbener Brustfleck oder Längsstrich, der auch fehlen kann. Schwanz meist etwas kürzer als Körper, mit 130–180 Schuppenringen.

---

### Verbreitung

Häufigste Langschwanzmaus in Mitteleuropa. Eurasien bis zum Altai, im Süden bis Palästina und NW-Afrika.

---

### Biologie

**Lebensraum:** Weniger an den Wald gebunden, sondern auch auf Feldern, in Feldgehölzen und in der offenen Landschaft anzutreffen. Im Winter gelegentlich auch in Häusern.

**Lebensweise:** Ähnlich Gelbhalsmaus, lebt jedoch mehr am und im Boden in Synusien (Lebensgemeinschaften) mit Wühlmäusen und Spitzmäusen. Benutzt Wühlmaus- und Maulwurfsbaue.

**Ernährung:** Hauptsächlich Samen aller Art. Insekten nur zu einem geringeren Anteil als die Gelbhalsmaus.

**Baue:** Gänge im Boden, bis zu 50 cm tief, meist relativ kurz und mit mehreren Ausgängen ausgestattet. Die Nestkammer wird mit trockenen Laub ausgepolstert.

**Aktivität:** So gut wie ganz nachtaktiv.

**Alter:** 4–5 Jahre in Gefangenschaft, etwa 6–8 Monate im Freiland.

---

### Bestimmung

! Die Waldmaus gleicht der Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis*)

---